

Preparation for Colon Operations/ Preparación de Operaciones de Colon/ Preparasyon pou Operasyon Colon



General Guidelines

- The day before surgery do not eat solid food. Drink liquids that are clear. Examples are broth, apple juice, white grape juice, light color jell-o.
- Drink a gallon of Golytely or generic. Drink it slowly starting around 11 am. You can take one cup every 15 minutes to half hour until gone.
- Take your antibiotics as prescribed the day prior to surgery: One dose at 2:00 pm, 5:00 pm, 9:00 pm.
- Take a fleet enema per rectum before going to bed.
- The stools should be clean looking and liquid.
- Do not eat or drink after midnight.

Reglas Generales

- El día antes de la cirugía no coma alimentos sólidos. Beba líquidos que sean claros. Ejemplos de estos son el caldo, jugo de manzana, jugo de uva blanca, gelatina clara.
- Tome un galón de Golytely o genérico. Beba lentamente comenzando alrededor de las 11 am. Usted puede tomar una taza cada 15 minutos o media hora hasta que se acabe.
- Tome sus antibióticos prescritos el día antes de la cirugía: Una dosis a las 2:00 pm, 5:00 pm, y 9:00 pm.
- Tome un enema de flota por el recto antes de ir a la cama.
- Las heces deben ser de aspecto limpio y líquido.
- No coma ni beba nada después de la medianoche.

Gid Jeneral

- Jou a anvan operasyon pa manje manje solid. Bwè likid ki klè. Men kèk egzanzp yo bouyon, ji pòm, blan ji rezen, limyè jelatin koulè.

- Bwè yon galon Golitely oswa jenerik. Bwè li tou dousman kòmanse nan 11 am. Ou ka pran yon tas chak 15 minit a 30 minit jiskaske ale.
- Pran antibyotik ou kòm preskri jou a anvan operasyon: Yon dòz nan 2:00 pm, 5:00 pm, 9:00 pm.
- Pran yon lavman flòt pou chak rektòm anvan ou ale nan kabann.
- ban yo ta dwe pwòp kap ak likid.
- pa manje oswa bwè apre minwi.